

Appendix 1. Turkish version of the Early Arthritis for Psoriatic Patients (EARP-TR) questionnaire

No	Soru	Yanıt (Evet/Hayır)
1	Bir veya daha fazla eklemde ağrınız var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
2	Sabah sertliğiniz 30 dakikadan uzun sürüyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
3	Eklem şişliği yaşıyor musunuz?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
4	Topuk veya Aşil tendonu bölgesinde ağrınız oldu mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
5	Parmaklarınızda veya ayak parmaklarınızda 'sosis parmak' şeklinde şişlik oldu mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
6	Hareket etmekle düzelen bel ağrınız var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
7	Psoriasis alevlenmeleri sırasında eklem ağrınız artıyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
8	Dinlendikten veya uzun süre oturduktan sonra eklemlerinizde sertlik hissediyor musunuz?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
9	Sertlik veya şişlik nedeniyle yumruğunuzu kapatmakta zorlanıyor musunuz?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
10	Kas veya tendonların kemiğe yapıştığı bölgelerde (örneğin dirsek, diz) ağrınız oldu mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır

Puanlama: Her 'Evet' yanıtı 1 puan olarak değerlendirilir. Toplam puan aralığı 0–10'dur. Kesme değeri ≥ 3 , psoriatik artrit olasılığını gösterir ve romatoloji değerlendirmesi gerektirir.

Appendix 2. Test–retest reliability protocol

Fifty psoriasis patients completed the EARP-TR twice at a 7–14-day interval under stable clinical conditions. Reliability was assessed using the two-way mixed-effects intraclass correlation coefficient ($ICC_{2,1}$), yielding $ICC = 0.998$ (95 % CI: 0.996–0.999). No significant differences were observed between time points (paired $t = 0.42$, $p = 0.68$).